


باسم‌هه تعالی

نام و نام خانوادگی:	سال سوم آموزش متوسطه	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۱۰ صبح	مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه
تعداد صفحه:	۱۳۹۵ / ۰۶	تاریخ امتحان:		
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در فوبت دی ماه سال ۱۳۹۵	مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir			

ردیف	نمره	سؤالات (پاسخ نامه دارد)
------	------	-------------------------

توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) بلا مانع است.

۱	<p>درجاهای خالی عبارت مناسب قرار دهید.</p> <p>الف) مجموعه شامل همه حالت‌های ممکن در به وقوع پیوستن یک پدیده تصادفی را می‌نامیم.</p> <p>ب) اگر A و B دو پیشامد در فضای نمونه‌ای S باشند و $A \cap B \neq \emptyset$ ، آن‌گاه A و B را دو پیشامد می‌نامیم.</p>
۲	<p>عقربه‌ای مطابق شکل زیر و به تصادف پس از به حرکت در آمدن روی یکی از <u>۸</u> ناحیه شکل می‌ایستد و عددی را نشان می‌دهد، مطلوب است :</p> <p>الف) پیشامد A که در آن عقربه روی عدد مضرب <u>۳</u> باشد.</p> <p>ب) پیشامد B که در آن عقربه عددی بزرگ‌تر از <u>۴</u> را نشان دهد.</p> <p>ج) پیشامد C که در آن عقربه عددی کوچک‌تر از <u>۷</u> که فرد یا اول باشد را نشان دهد.</p> 
۳	<p>تاسی را سه بار می‌اندازیم مطلوب است احتمال آن که :</p> <p>الف) هر سه عدد رو شده مثل هم باشند.</p> <p>ب) هر سه عدد رو شده متمایز باشند. (هیچ دو عددی مثل هم نباشند)</p> <p>ج) مجموع اعداد رو شده سه تا سه بزرگ‌تر از <u>۱۷</u> نباشد.</p>
۴	<p>به ازای چه مقدار k، معادله $\frac{4-t}{2-2t} = \frac{3t^2+k}{(t^2+1)^2-68}$ دارای جواب $-3 = t$ است؟</p>
۵	<p>نامعادله $\frac{2x-1}{x+2} \geq -2$ را حل کرده و مجموعه جواب را به صورت بازه نشان دهید.</p>
۶	<p>اگر $\tan x = \frac{3}{4}$ و x زاویه‌ای حاده باشد. عبارت $\cos 2x$ را محاسبه کنید.</p>
۷	<p>ضابطه تابع f به صورت $f(x) = \begin{cases} 2ax^2 + 7 & x \geq 0 \\ bx - 1 & x < 0 \end{cases}$ داده شده است. مقادیر a و b را طوری تعیین کنید که $f(-2) = 3$ و نمودار تابع f از نقطه $(2, -1)$ A بگذرد.</p>
۸	<p>اگر $-1 = f(x) = 4x - k$ و $g(x) = 2x + k$ باشد مقدار k را طوری بیابید که داشته باشیم:</p> $(gof)(x) = 8x + 10$
۹	<p>تابع $g(x) = \frac{1}{x-1}$ داده شده‌اند. دامنه تابع gof را با استفاده از تعریف به دست آورید.</p> $f(x) = \sqrt{x-4}$
ادامه سوالات در صفحه دوم	

پاسمه تعالی

ساعت شروع: ۱۰ صبح	رشته: علوم تجربی	سال سوم آموزش متوسطه	نام و نام خانوادگی:
مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۲	تاریخ امتحان: ۱۳۹۵/۱۰/۰۶	
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در فوبت دی ماه سال ۱۳۹۵ مرکز سنجش آموزش و پرورش http://ace.medu.ir			

ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
۱۰	اگر به ازای هر x داشته باشیم $f(x) \leq 2\cos x \leq 2 - x^2$ ، حد تابع $f(x)$ را در $x = 0$ تعیین کنید.	۰/۷۵
۱۱	هر یک از حدهای زیر را حساب کنید.	
۱۲	عددهای a و b را چنان بیابید که تابع زیر در نقطه $x = 0$ پیوسته باشد.	۱/۲۵
۱۳	با استفاده از تعریف مشتق، مشتق تابع زیر را در نقطه داده شده به دست آورید.	۱
۱۴	معادله حرکت متحرکی به صورت $f(t) = 200t^2 - 50t$ می‌باشد.	۱/۲۵
۱۵	مشتق توابع زیر را به دست آورید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست)	۱/۷۵
	"موفق باشید"	۲۰

باشه تعالی

رشته: علوم تجربی	راهنمای تصویب امتحان نهایی درس: ریاضی (۳)
تاریخ امتحان: ۱۳۹۵ / ۰۶ / ۱۰	سال سوم آموزش متوسطه
مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داولطلبان آزاد سراسر کشور (دی ماه) سال ۱۳۹۵

ردیف	راهنمای تصویب	نمره																										
۱	(الف) فضای نمونه‌ای (۰/۲۵) ب) سازگار (۰/۲۵) (۰/۲۵) صفحات ۸ و ۲	۰/۵																										
۲	(الف) $A = \{3, 6\}$ (۰/۵) (ب) $B = \{5, 6, 7, 8\}$ (۰/۵) (ج) $C = \{1, 2, 3, 5\}$ (۰/۵) (۱۲) صفحه	۱/۵																										
۳	$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{6}{216} = \frac{1}{36}$ (۰/۲۵) $P(B) = \frac{\overbrace{6 \times 5 \times 4}^{(0/25)}}{216} = \frac{120}{216}$ (۰/۲۵) (۱۷) صفحه $C = \{(6, 6, 6)\}$ (۰/۲۵) $P(C) = \frac{1}{216}$ (۰/۲۵) $\Rightarrow P(C') = 1 - P(C)$ (۰/۲۵) $\Rightarrow P(C') = \frac{215}{216}$ (۰/۲۵)	۲																										
۴	$\frac{4 - (-3)}{2 - 2(-3)} = \frac{3(-3)^2 + k}{((-3)^2 + 1)^2 - 68}$ (۰/۲۵) $\Rightarrow \frac{7}{8} = \frac{27 + k}{100 - 68}$ (۰/۲۵) (۲۸) صفحه $\Rightarrow k = 1$ (۰/۲۵)	۰/۷۵																										
۵	$x - 2 - \frac{2x - 1}{x + 2} \geq 0$ (۰/۲۵) $\Rightarrow \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 2} \geq 0$ (۰/۲۵) (۳۱) صفحه <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>x</td> <td>$-\infty$</td> <td>-۲</td> <td>-۱</td> <td>۳</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$x^2 - 2x - 3$</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>$x + 2$</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>$\frac{x^2 - 2x - 3}{x + 2}$</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> </tr> </table> جدول تعیین علامت: (۱ نمره) $x \in (-2, -1] \cup [3, +\infty)$ (۰/۵)	x	$-\infty$	-۲	-۱	۳	$+\infty$	$x^2 - 2x - 3$	+	+	0	-	0	+	$x + 2$	-	0	+	+	+	$\frac{x^2 - 2x - 3}{x + 2}$	-	+	0	-	0	+	۲
x	$-\infty$	-۲	-۱	۳	$+\infty$																							
$x^2 - 2x - 3$	+	+	0	-	0	+																						
$x + 2$	-	0	+	+	+																							
$\frac{x^2 - 2x - 3}{x + 2}$	-	+	0	-	0	+																						
۶	$\frac{1}{1 + \tan^2 x} = \cos^2 x$ (۰/۲۵) $\Rightarrow \frac{1}{1 + \frac{9}{16}} = \cos^2 x$ (۰/۲۵) $\Rightarrow \cos^2 x = \frac{16}{25}$ (۰/۲۵) (۴۶) صفحه $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1 = 2 \times \left(\frac{16}{25}\right) - 1 = \frac{7}{25}$ (۰/۲۵)	۱/۵																										

باسم‌هه تعالی

رشته: علوم تجربی	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: ریاضی (۳)
تاریخ امتحان: ۱۳۹۵ / ۰۶ / ۱۰	سال سوم آموزش متوسطه
مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir	دانش‌آموزان روزانه، بزرگسال و داولطلبان آزاد سراسرکشور (دی ماه) سال ۱۳۹۵

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۷	$2a(2)^2 + 7 = -1 \quad (0/25) \Rightarrow a = -1 \quad (0/25)$ $b(-2) - 1 = 3 \quad (0/25) \Rightarrow b = -2 \quad (0/25)$	۱
۸	$g(f(x)) = g(4x - 1) = 8x - 2 + k \quad (0/25) \Rightarrow 8x - 2 + k = 8x + 10 \quad (0/25)$ $\Rightarrow k = 12 \quad (0/25)$	۰/۷۵
۹	$D_f = [4, +\infty) \quad (0/25), \quad D_g = R - \{1\} \quad (0/25)$ $D_{gof} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\} = \{x \geq 4 \mid \sqrt{x-4} \neq 1\} \quad (0/25) \Rightarrow$ $D_{gof} = [4, +\infty) - \{5\} \quad (0/25)$	۱
۱۰	$\lim_{x \rightarrow \infty} 2-x^2 = 2 \quad (0/25)$ $\lim_{x \rightarrow \infty} 2\cos x = 2 \quad (0/25) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2 \quad (0/25)$	۰/۷۵
۱۱	(الف) $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{(x+4)(\sqrt{3x+13}+1)}{3x+13-1} \stackrel{(0/25)}{=} \lim_{x \rightarrow -4} \frac{(x+4)(\sqrt{3x+13}+1)}{3(x+4)} \stackrel{(0/25)}{=} \frac{2}{3} \quad (0/25)$ (ب) $\lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{\frac{\sin 5x}{x}}_{(0/25)} \times \underbrace{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{3x}}_{(0/25)} = 5 \times 1 = 5$ (ج) $\lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{2x}{\cos x} = \frac{\pi}{0^-} = -\infty \quad (0/5)$ (د) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{\frac{8x+1}{x+ x }}_{(0/25)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{\frac{8x+1}{2x}}_{(0/25)} = 4 \quad (0/25)$	۳

باسم‌هه تعالی

رشته: علوم تجربی	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: ریاضی (۳)
تاریخ امتحان: ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۰۶	سال سوم آموزش متوسطه
مکر سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir	دانشآموزان روزانه، بزرگسال و داولطلبان آزاد سراسرکشور (دی ماه) سال ۱۳۹۵

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۲	$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x + a = a \quad (0/25)$ $\Rightarrow f(0) = -4 = a = 2b \quad (0/25)$ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 2b \quad (0/25)$ $\Rightarrow a = -4 \quad (0/25), \quad b = -2 \quad (0/25)$ <p style="text-align: right;">صفحات ۹۴ و ۱۲۱</p>	۱/۲۵
۱۳	$f'(-1) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{-1}}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{2(1-x)} = \frac{1}{4} \quad (0/25)$ <p style="text-align: right;">صفحه ۱۳۳</p>	۱
۱۴	<p style="text-align: center;">الف</p> $\frac{f(4) - f(0)}{4 - 0} = \frac{3000 - 0}{4} = 750 \quad (0/25)$ <p style="text-align: center;">ب</p> $f'(t) = 400t - 50 \quad (0/25) \Rightarrow f'(3) = 1200 - 50 = 1150 \quad (0/25)$ <p style="text-align: right;">صفحات ۱۲۹ و ۱۳۰</p>	۱/۲۵
۱۵	<p style="text-align: center;">الف</p> $f'(x) = \frac{2x - 1}{2\sqrt{x(x-1)}} + 3x^2 + 2 \quad (0/25)$ <p style="text-align: center;">ب</p> $g'(x) = \frac{-\sin x \cos x (1 + \tan^2 x) - 5(1 + \tan^2 x) \cos^2 x}{(1 + \tan^2 x)^2} \quad (0/25)$ <p style="text-align: right;">صفحات ۱۳۸ و ۱۴۳</p>	۱/۷۵

با سلام و خسته نباشد، مصححین محترم، لطفاً برای راه حل های درست دیگر بارم را به تناسب تقسیم نمائید.