

باسمہ تعالیٰ

ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۱۵۰ دقیقه	رشته: ریاضی فیزیک	سوالات امتحان نهایی درس: حسابان
تاریخ امتحان: ۱۳۹۱/۳/۲۰			سال سوم آموزش متوسطه
دانشآموزان و داوطلبان آزاد سراسرکشور در خرداد ماه سال ۱۳۹۱			مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir

ردیف	نمره	سؤالات
۱	۰/۷۵	۱۴۴ لیتر آب میوه، ۴۵ لیتر شیر و ۶۳ لیتر دوغ در شیشه هایی با حجم یکسان بسته بندی شده اند. حداقل تعداد شیشه ها را بیابید؟ (گنجایش شیشه ها را بحسب لیتر، عدد طبیعی فرض کنید).
۲	۰/۷۵	در دنباله‌ی هندسی نا متناهی زیر، مجموع تمام جملات را بیابید. $\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \dots$
۳	۱	معادله‌ی $\sqrt{1-x} - 1 = x^2 - 2x$ را با روش هندسی حل کنید.
۴	۲/۲۵	جاهای خالی را با عبارات ریاضی مناسب پر کنید: الف) مجموعه‌ی جواب معادله‌ی $\frac{x}{x-3} + \frac{3}{x-1} = 5$ برابر است با ب) اگر $1 \leq x$ باشد، ضابطه‌ی تابع $y = x-3 + x-1 $ بدون استفاده از قدر مطلق برابر است با ج) تابع زیر در بازه‌ی صعودی اکید و در بازه‌ی نزولی اکید و در بازه‌ی ثابت است.
۵	۱/۲۵	د) اگر α و β ریشه‌های معادله‌ی درجه‌ی دوم $ax^2 + bx + c = 0$ باشند ریشه‌های معادله‌ی درجه‌ی دوم $cx^2 + bx + a = 0$ برابرند با و در زیر، نمودار تابع $y = f(x)$ رسم شده است. با استفاده از انتقال، ابتدا نمودار تابع $y = f(x-3)$ را رسم کرده و سپس نمودار تابع $y = -2f(x-3)$ را رسم کنید.
۶	۱	اگر $f(x) = \sqrt{x-3}$ و $g = \{(0, 4), (3, 2), (5, 6)\}$ دوتابع باشند: الف) تابع fog را به صورت زوج های مرتب بنویسید. ب) دامنه‌ی تابع $\frac{f}{g}$ را بنویسید.

ادامه‌ی سوالات در صفحه‌ی دوم

با سمه تعالی

ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۱۵۰ دقیقه	رشته: ریاضی فیزیک	سوالات امتحان نهایی درس: حسابان
تاریخ امتحان: ۱۳۹۱/۳/۲۰			سال سوم آموزش متوسطه
مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir	دانشآموزان و داوطلبان آزاد سراسرکشور در خرداد ماه سال ۱۳۹۱		

ردیف	سوالات	نمره
------	--------	------

۷	ثابت کنید تابع $f(x) = (x-2)^x$ ، $x \geq 2$ وارون پذیر است سپس ضابطه ای وارون آن را بنویسید.	۱
۸	سینوس زاویه $\frac{2\pi}{5}$ را حساب کنید.	۱
۹	کلیه ای جواب های معادله $2\cos^2 x - \cos x = 0$ را تعیین کنید.	۱/۲۵
۱۰	مقدار $(\tan^{-1} \frac{3}{4}) \cos$ را حساب کنید.	۰/۷۵
۱۱	حد توابع زیر را در صورت وجود، محاسبه کنید:	۲/۲۵
	(الف) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x-2}}{x^2 - 16}$ (ب) $\lim_{x \rightarrow 3^+} (x - [x])$ (ج) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x}$	
۱۲	مقدار a را طوری بیابید که تابع زیر در $x=1$ پیوسته شود.	۱
	$f(x) = \begin{cases} a - x-1 & x \geq 1 \\ \frac{x^r - 1}{x - 1} & x < 1 \end{cases}$	
۱۳	نمودار تابعی را رسم کنید که در یک همسایگی راست $x=2$ تعریف شده باشد ولی در هیچ همسایگی چپ $x=2$ تعریف نشده باشد و در این نقطه حد داشته باشد.	۰/۷۵
۱۴	معادله ای خط قائم بر نمودار تابع $f(x) = 2x^3 - 2x$ را در نقطه ای به طول ۱ واقع بر منحنی به دست آورید.	۱/۲۵
۱۵	مشتق بگیرید: (ساده کردن الزامی نیست)	۲/۷۵
	(الف) $y = (x^r + \frac{1}{x})$ (ب) $y = 3(2x-5)^4 + \sqrt[3]{x}$ (ج) $y = \frac{\sin \sqrt{x}}{1+x^2}$	
۱۶	آیا تابع $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ در صفر مشتق پذیر است؟ (دلیل خود را توضیح دهید)	۱
	«موفق باشید»	۲۰

با اسمه تعالی

رشته‌ی: ریاضی فیزیک	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: حسابان
تاریخ امتحان: ۱۳۹۱ / ۳ / ۲۰	سال سوم آموزش متوسطه
مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir	دانشآموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال ۱۳۹۱

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	$144 = 3^2 \times 4^2$ $45 = 3^2 \times 5$ $63 = 3^2 \times 7$ } \Rightarrow 3^2 = ب.م.م (۰/۵) تعداد شیشه ها و (۰/۲۵)	۰/۷۵
۲	$\frac{a}{1-q} = \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{1}{2}$ مجموع تمام جملات (۰/۵) (۰/۲۵)	۰/۷۵
۳	$f(x) = \sqrt{1-x}$, $g(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$ (۰/۵) : جواب های معادله $A(0, 1)$ (۰/۲۵), $B(1, 0)$ (۰/۲۵)	۱
۴	الف) مجموعه جواب $\left\{ 4, \frac{3}{2} \right\}$ (۰/۵) ب) $y = 4 - 2x$ (۰/۵) ج) $[0, 2]$: صعودی اید (۰/۲۵) $[5, +\infty)$ (۰/۲۵) : نزولی اید (۰/۲۵) د) $\frac{1}{\alpha}$ (۰/۲۵), $\frac{1}{\beta}$ (۰/۲۵)	۲/۲۵
۵	 $y = f(x-3)$ (۰/۵)	۱/۲۵
	 $y = -2f(x-3)$ (۰/۷۵)	
ادامه در صفحه ی دوم		

با اسمه تعالی

رشته‌ی: ریاضی فیزیک	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: حسابان
تاریخ امتحان: ۱۳۹۱ / ۳ / ۲۰	سال سوم آموزش متوسطه
مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir	دانشآموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال ۱۳۹۱

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۶	<p>الف) $fog = \{(0, 1), (5, \sqrt{3})\} (0/5)$</p> <p>ب) $D_f = \{3, 5\} (0/5)$</p>	۱
۷	<p>$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow (x_1 - 2)^2 = (x_2 - 2)^2 \Rightarrow (x_1 - 2) = (x_2 - 2) \Rightarrow x_1 = x_2 (0/25)$</p> <p>$y = (x - 2)^2 \Rightarrow \sqrt{y} = (x - 2) \Rightarrow \sqrt{y} + 2 = x (0/25)$</p> <p>$x = \sqrt{y} + 2 \Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt{x} + 2 (0/25)$</p>	۱
۸	<p>$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha \Rightarrow \cos 45^\circ = 1 - 2\sin^2 22.5^\circ (0/25) \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 - 2\sin^2 22.5^\circ (0/25) \Rightarrow$</p> <p>$2\sin^2 22.5^\circ = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \sin^2 22.5^\circ = \frac{2 - \sqrt{2}}{4} (0/25) \Rightarrow \sin 22.5^\circ = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}}{2} (0/25)$</p>	۱
۹	<p>$\cos x = 0 (0/25) \rightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{2} (0/25)$</p> <p>$\cos x(2\cos x - 1) = 0 (0/25) \rightarrow \begin{cases} 2\cos x - 1 = 0 (0/25) \rightarrow \cos x = \frac{1}{2} \rightarrow \\ \end{cases}$</p> <p>$x = 2k\pi + \frac{\pi}{3} (0/25)$</p> <p>$x = 2k\pi - \frac{\pi}{3} (0/25)$</p>	۱/۲۵
۱۰	<p>$\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) = \alpha \rightarrow \tan \alpha = \frac{3}{4} (0/25) \quad \cos\left(\tan^{-1}\frac{3}{4}\right) = \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 \alpha}} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{9}{16}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{25}{16}}} = \frac{1}{5} = \frac{4}{5} (0/5)$</p>	۰/۷۵
۱۱	<p>الف) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x-2}}{(x-4)(x+4)} \times \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x+2}} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4) (0/25)}{(x-4)(x+4)(\sqrt{x+2})} = \frac{1}{4 \times 4} = \frac{1}{32} (0/25)$</p> <p>ب) $\lim_{x \rightarrow 3^+} (x - [x]) = 3 - 3 = 0 (0/5)$</p> <p>ج) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos x - \sin x} (0/25) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x)}{(\cos x - \sin x)} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} (0/5)$</p>	۲/۲۵

ادامه در صفحه‌ی سوم

با اسمه تعالی

رشته‌ی: ریاضی فیزیک	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: حسابان
تاریخ امتحان: ۱۳۹۱ / ۳ / ۲۰	سال سوم آموزش متوسطه
مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir	دانشآموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور در خرداد ماه سال ۱۳۹۱

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۲	$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ (۰/۲۵) شرط پیوستگی	۱
۱۳	رسم نمودار با شرط‌های خواسته شده (۰/۷۵)	۰/۷۵
۱۴	$f(1) = 2(1)^3 - 1 = 1$ (۰/۲۵) $y' = 6x^2 - 1$ (۰/۲۵) $m = -\frac{1}{f'(1)} = -\frac{1}{5}$ (۰/۲۵) $y - y_0 = m(x - x_0) \rightarrow y - 1 = -\frac{1}{5}(x - 1)$ (۰/۵)	۱/۲۵
۱۵	$y' = 3x^2 - \frac{1}{x^4}$ (الف) $y' = 2 \times 3 \times 2x \left(\sqrt[4]{x} - 5\right)^3 + \frac{1}{\sqrt[4]{x^2}}$ (ب) $y' = \frac{\left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \cos \sqrt{x}\right)(1+x^2) - (1x) \left(\frac{1}{2} \sin \sqrt{x}\right)}{(1+x^2)^2}$ (ج)	۲/۷۵
۱۶	خیر (۰/۲۵) وجود ندارد (۰/۲۵)	۱

همکاران محترم ضمن عرض خسته نباشد لطفا به راه حل‌های صحیح غیر از راهنمای تصحیح به تناسب بارم را تقسیم کنید.

با تشکر طراحان